

Mayo 16 de 2016

No. 4

Vicente Rey V
Fitopatólogo proyecto sigatoka negra
Cenibanano – Augura

ALERTA TEMPRANA SIGATOKA NEGRA

Los pronósticos de esta semana y la semana anterior de NOAA e IRI, respectivamente, indican una alta probabilidad de que ENSO pase a una fase fría (Niña) a lo largo del segundo semestre de este año. Las investigaciones de Cenibanano han mostrado que en las épocas de fases neutra o fría de ENSO la sigatoka negra alcanza una mayor severidad cuando se les compara con las de fase cálida (Niño), que es en la que nos encontramos actualmente.

Señor productor: le recomendamos mantener su finca al día en las labores culturales de control de la sigatoka, así como todas las labores del cultivo que inciden en la enfermedad, como los drenajes, el desmache, etc. Si su plantación entra con la menor cantidad de inóculo potencial (representado en tejido quemado) a la época en que las condiciones climatológicas favorecen la enfermedad, será menos complicado su control. Así usted complementa de forma importante el manejo químico de la enfermedad.

Recuerde realizar en cada lote las diferentes labores culturales de manejo de la enfermedad a que haya lugar con una periodicidad de máximo siete días. De igual forma, no olvide efectuar el realce (eliminación de folíolos de las planas jóvenes), dado que también estas hojas juveniles soportan el ciclo de vida de la sigatoka negra con producción de inóculo asexual y sexual.

La meta es lograr mantener sus plantas libres de quema por la enfermedad desde ahora mismo.

Carepa, semana 20/2016