

Marzo 31 de 2016

No. 2

Vicente Rey V  
Fitopatólogo proyecto sigatoka negra  
Cenibanano – Augura

## CON LA SIGATOKA NEGRA SIEMPRE ALERTA

Puesto que *Mycosphaerella fijiensis*, agente causal de la enfermedad, requiere de condiciones de humedad para llevar a cabo varias fases de su ciclo de vida, y dadas las condiciones de fuerte y prolongado verano experimentadas en Urabá desde la última parte de diciembre/2015 hasta el momento, la enfermedad no ha sido de relevancia.

Sin embargo, como ya ha ocurrido otras veces, una vez se restablezcan las condiciones climatológicas favorables para la esporulación y dispersión del microorganismo, la sigatoka negra volverá a mostrar su efecto en las plantaciones.

Por tal motivo, y ante la proximidad del inicio de una nueva temporada de lluvias, señor productor, Cenibanano recomienda tener completamente al día las plantaciones en cuanto a la labor cultural de manejo de la sigatoka negra. Si bien es inevitable que a los cultivos llegue inóculo procedente de fuentes “naturales”, si en la plantación hay fuentes potenciales de inóculo y se presentan las lluvias, más temprano y con mayor intensidad se tendrá que lidiar con la enfermedad.

Recuerde que el éxito del manejo de este limitante está dado tanto por el uso adecuado de fungicidas como por la eliminación de tejido afectado, que depende de usted.

El Niño está en remisión, y se pronostica un cambio inicial a fase neutra y posteriormente a fase fría (Niña) en este año, condiciones que hacen más severa la enfermedad; si los cultivos están adecuadamente sometidos a las labores culturales propias del manejo de la enfermedad, se contribuye a aminorar la enfermedad.