

4 de febrero de 2020

CENIBANANO ATENTO ANTE EL INCREMENTO DE PLAGAS EN EL CULTIVO DE BANANO

El Centro de Investigaciones del Banano, CENIBANANO, ha trabajado durante los últimos años en el monitoreo y manejo integrado de plagas del banano en las diferentes épocas y condiciones climáticas del año.



Para esta temporada de verano, recuerde realizar monitoreos constantes de poblaciones de ácaros o arañita roja. Las condiciones de clima seco y altas temperaturas son factores favorables para los incrementos en poblaciones de estos artrópodos.



La arañita roja tiene un ciclo biológico relativamente corto (entre 7-12 días), pero con el aumento de las temperaturas puede reducirse incluso a 5 días reproduciéndose rápidamente, esto sumado al estrés hídrico de la planta puede causar daños muy severos a nivel foliar.

Para su manejo pueden utilizarse algunas aplicaciones de productos como jabones, aceites y/o productos azufrados, pero siempre siga las recomendaciones dadas por el técnico. Entre algunas de estas, verifique la presencia de enemigos naturales, realice aplicaciones en los focos y no de forma generalizada, ya que algunos de estos productos también pueden afectarlos, además, tenga en cuenta la hora de aplicación, al inicio de la mañana o al final de la tarde preferiblemente, para evitar quemaduras en las hojas.